N°. 4

par M. Mirault chirurgien en chef de l'hopital d'Angers.

Cure d'un anevrisme vrai de l'artere brachiale operé à la methode de hunter

Le 24 fevrier 1789 rené poisson fusilier au regiment du maine âgé de 19 ans, de la paroisse st aubin des ponts de cés près angers, etant en garnison a Bastia en Corse reçut en se battant un coup de bayonette a la partie moyeñe et anterieure du bras, dans une direction oblique, telle, que sa sortie par derriere etoit un pouce et demi plus haute que l'entrée. les playes saignerent beaucoup. (sans doute par l'ouverture de la veine brachiale profonde) conduit a l'hopital, il y fut saigné une fois et en sortit le 22me jour ses playes gueries.

il s'appercut peu de tems après d'une petite tumeur grosse comme un oeuf de pigeon, trois semaines après elle etoit plus elevée et on y sentoit des battements de pulsation; il rentra a l'hopital ou on lui appliqua une plaque de plomb et pardessus un bandage

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 54 n° 6

serré quil ne put garder que quinze jours
le bras etant devenu engourdi et tres enflé.
la compression cessée ces accidents disparurent,
vers le 30 mai elle avoit le volume d'un
oeuf de canne, epoque ou il partit pour
se rendre en semestre. ——

au mois de 7bre la tumeur se developpant
toujours avoit acquis la grosseur d'une pomme
de rambour, ~~cette~~ l'empechoit de travailler.
il vint me consulter, et d'après le recit
cy dessus je presumai que dans le moment
ou il recut le coup, l'artère brachiale avoit
été entamée par un des equerres de la baïonette.
je lui proposai l'operation necessaire pour
sa guerison, il l'accepta et l'ayant fait
saigner deux fois je l'operai le 15 7bre
en presence de mes confreres des deux medecins
de l'hôtel dieu et du chirurgien major
de roïal picardie. ——

Sur un pli de la peau je fis une
incision de l'etendue de deux pouces et demi
qui commencant a un demi pouce audessus
de la tumeur se prolongeoit vers le creux

de l'aisselle dans la direction du trajet
de l'artére: je mis peu a peu le plexus brachial
a decouvert, la veine profonde qui avoit la
grosseur du petit doigt, et enfin l'artére qui
etoit par derriere que je parvins a isoler
dans l'espace d'un pouce. je placai deux
ligatures a neuf lignes d'intervale, la supe-
-rieure audessous de la musculaire interne,
et l'inferieure au dessus de la musculaire
externe qui naissoit tres prés de la tumeur.
je serrai a demi la superieure, et l'inferieure
assez pour ne plus sentir de pulsation
dans la tumeur. je placai les cordons des
ligatures de chaque coté de la playe, et
pansai mollement; l'operation qui dura
environ vingt minutes parut tres doulou-
-reuse pour le malade surtout lorsqu'on
ecartoit les cordons de nerfs.

Le landemain j'apperçus beaucoup de
gonflement, j'imbibai les compresses d'eau
et d'eaudevie, le fis saigner et prescrivis
une boisson acidulée. le troisieme jour je
levai avec facilité toutes les pieces de l'appareil

ACADEMIE NATIONALE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

la plaije sentoit fort mauvais, il fut pansé deux fois par 24 heures; mais quelle fut ma surprise au sixieme jour de voir les deux ligatures detachées suivre la charpie qui remplissoit la plaije: je fus tres inquiet, je recommandai la diette severe et le repos le plus parfait, dans la craitnte de l'hemorragie.

Le gonflement des bords de la plaije ayant élevé en proportion les ligatures qui y etoient collées, l'artere se trouva soulevée, tirée en dehors et a tombé en mortification visavis les deux points ou elle etoit comme suspendue, il ne peut y avoir d'autre cause, mon attention en faisant les ligatures aijant été de serrer seulement avec un ruban de fil plat au point d'intercepter le passage du sang, et non d'étrangler l'artére. heureusement le caillot a chaque point de l'artére coupée, ou l'adhesion de ses parois entre elles furent assez fermes pour s'opposer a l'hemorragie. —

Dans l'espace de huit jours la tumeur diminua d'un sixieme, ses bosselures et inegalités separées par un etranglement dispa-rurent, et elle ne presentoit plus qu'une tumeur uniformement arondie. le pouls parut sensible des le landemain, et il a toujours resté fort petit relativement a celui du côté opposé, ce dont il est aisé de se rendre compte.

Le bras pendant le traitement qui a duré un mois n'a rien perdu de sa chaleur, ~~mobilitént~~ mobilité et sensibilité. le ressort des parois de l'artere, la resorbtion de la partie sereuse et la plus fluide du sang, des compresses trempées dans de l'eau de vie appliquées sur la tumeur, et une compression moderée ont achevé de la reduire au point ou on la voit peinte dans le tableau, elle n'excede pas de six lignes le niveau du bras elle a un pouce et demi de largeur sur deux de longeur, et presente au toucher une tumeur applatie, ovalaire tres dure assez mobile, insensible et qui ne gêne nullement le dit poisson qui travaille journellement aux carrieres a ardoise.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

L'accident survenu me tiendra en garde une autre fois; au lieu de placer les ligatures sur les bords de la playe, j'aurai soin de les ranger dans les angles de maniere a ce quelles ne puissent jamais être tendues.